

Alertes agricoles

التنبهات الزراعية

PSYLLE DU POIRIER

14/05/2018

Des œufs et larves de psylle ont été observés sur feuilles et rameaux de poirier au niveau des wilayas de Chlef et d'Ain Defla.

Le psylle, par ses piqûres, ingère une quantité importante de sève affaiblissant l'arbre et provoquant la formation de la fumagine sur feuilles et fruits, due à la présence du miellat, ce qui déprécie leur qualité commerciale.

En conséquence, nous invitons les arboriculteurs des régions concernées, à intervenir avec un insecticide spécifique (ovicide ou larvicide) afin de garantir une meilleure protection des dégâts que peuvent être causés par ce ravageur.

NB : Les arboriculteurs des autres wilayas doivent accentuer leur vigilance afin de repérer les premiers œufs ou larves de cet insecte et d'intervenir de ce fait, au moment propice.



CONSEILS UTILES

- ➔ Veiller à pulvériser copieusement toutes les parties de l'arbre avec l'insecticide choisi.
- ➔ Alternier les matières actives des insecticides appliqués afin d'éviter le phénomène de la résistance.
- ➔ Le port de la tenue complète de protection est primordial.

Alertes agricoles

التنبهات الزراعية

2018/05/14

بسيلا الاجاص

لوحظ وجود بيض و يرقات حشرة البسيلا على أوراق والأغصان الاجاص على مستوى ولايات الشلف وعين دفة.

إن البسيلا، من خلال اللسعات، يمتص كمية كبيرة من النسغ مما يضعف الشجرة ويسبب تكوين العفن الأسود (فيماجين) على الأوراق والثمار بسبب وجود مادة عسلية، مما يقلل من جودتها التجارية.

نصائح مفيدة

- يرجى الرش الجيد لجميع أجزاء الشجرة بالمبيد الحشري المختار.

- يرجى عدم المعالجة بنفس المواد الفعالة للمبيدات المستعملة لتفادي المقاومة.

- استعمال البدلة الواقية أثناء المعالجة الكيميائية مهم جدا الحماية المستعمل.

وبالتالي، ندعو منتجي الاجاص للتدخل، مباشرة بعد كشف أول بيوض أو يرقات هذه الحشرة، بمبيد حشري مخصص (مضاد للبيض او مضاد لليرقات) لضمان حماية أفضل من الأضرار التي يمكن أن تسببها هذه الحشرة.

يجب على فلاحي لولايات الأخرى الزيادة من اليقظة من أجل الكشف المبكر لأول البيوض أو اليرقات والتدخل في الوقت المناسب.

