

الاضطرابات الحركية

Motor Disorders

تضم 3 اضطرابات

⦿ اضطراب التناسق الحركي

⦿ اضطراب الحركة النمطي

اضطراب توريث

اضطراب التناسق الحركي
Developmental Coordination
Disorder


معيار التشخيص

- اكتساب وتنفيذ المهارات الحركية المتناسقة أقل بكثير من المتوقع بالنسبة للعمر الزمني للفرد وبالنسبة لفرصة تعلم المهارة واستخدامها. (إسقاط أو صدم الأشياء، مثلاً).
البطء وعدم الدقة في أداء المهارات الحركية (مثلاً إمساك الأشياء باستخدام المقص أو أدوات المائدة، خط، وركوب الدراجة، أو المشاركة في الألعاب الرياضية).
- العجز في المهارات الحركية في البند الأول يتداخل بشكل كبير وباستمرار مع أنشطة الحياة اليومية المناسبة للعمر الزمني (على سبيل المثال، الاهتمام ورعاية النفس) ويؤثر على الإنتاجية الأكاديمية/المدرسية، والأنشطة المهنية، والترفيه، واللعب.
- بدء الأعراض في فترة النمو المبكر.
- لا يتم تفسير العجز في المهارات الحركية بالإعاقة الذهنية (اضطراب النمو الذهني) أو ضعف البصر ولا حالة عصبية تؤثر على الحركة (مثلاً، الشلل الدماغي).

نسبة الانتشار

- بين 3% و 6% (حسب عدد التلاميذ)
- النسبة: بين 2 و 8 ذكور مقابل أنثى واحدة

ثلاث خصائص مشتركة



التقديم

- على الرغم من جهود الوالدين ، فإن الأطفال غالبًا لباسهم "غير منظم" ، يرتدون ملابس غير مناسبة بعد الذهاب إلى المرحاض ،
- "عدم الإحساس بالانزعاج"
- الحركة والحركة الجامدة

التنشئة الاجتماعية

- طفل وحيد: حساسية من الضوضاء ،
- تواصل قليل مع أقرانهم
- اللعب مع الأطفال الأصغر أو الأكبر سنا

القدرات الأكاديمية

● بطء في أداء المهام

● الانتباه الصعب ، والتعب ،

التشخيص الفارق

- ◉ الإعاقة الحركية بسبب حالة طبية أخرى. الشلل الدماغي، الآفات التقدمية للمخيخ، الاضطرابات العصبية العضلية).
- ◉ الإعاقة الذهنية (اضطراب النمو الفكري).
- ◉ تشتت الانتباه وفرط الحركة.
- ◉ اضطراب طيف التوحد.
- ◉ متلازمة فرط الحركة المشتركة

الاضطرابات المصاحبة

- اضطراب الكلام واللغة.
- اضطراب التعلم المحدد (خاصة القراءة والكتابة) ؛
- مشاكل عدم الانتباه،
- بما في ذلك اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه
- اضطراب طيف التوحد؛ السلوك التخريبي
والعاطفي
- ومتلازمة فرط الحركة المشتركة.

اضطراب الحركة النمطي
Stereotypic Movement
Disorder

معيار التشخيص

- سلوك حركي متكرر غير هادف يبدو ذا دافع (على سبيل المثال، المصافحة أو التلويح باليد، أرجحة الجسم، أرجحة الرأس، عض الذات، ضرب الجسد).
- يتداخل السلوك الحركي المتكرر مع الأنشطة الاجتماعية والأكاديمية، أو غيرها، وربما يؤدي إلى إيذاء النفس.
- البداية في فترة النمو المبكر.
- السلوك الحركي المتكرر لا يُنسب إلى الآثار الفيزيولوجية لمادة ما أو لحالة عصبية ولا يُفسر بشك باضطراب آخر من اضطرابات النمو العصبي أو اضطراب عقلي آخر (مثل هوس نتف الشعر [اضطراب نتف الشعر] ، واضطراب الوسواس القهري).

معيّار التشخيص

● حدد ما إذا كان:

مع سلوك مؤذي للذات (أو سلوك كان من الممكن أن ينشأ عنه أذى جسدي لو لم تستخدم إجراءات وقائية).

دون سلوك مؤذي للذات.

حدد ما إذا كان:

يرتبط مع حالة طبية أو وراثية معروفة، اضطراب النمو العصبي، أو عامل بيئي (مثلاً، متلازمة ليش نيهان، والإعاقة الذهنية [اضطراب النمو الذهني،] التعرض للكحول داخل الرحم)

معيار التشخيص

● حدد الشدة:

1. خفيف: يتم تثبيط الأعراض بسهولة بمنبه حسي.
2. متوسط: تتطلب الأعراض تدابير وقائية واضحة وتعديل للسلوك.
3. شديد: يلزم المراقبة المستمرة مع الاستمرار في اتخاذ تدابير وقائية لمنع إصابة خطيرة

التشخيص التفريقي

- الحركات النمطية البسيطة شائعة في مرحلة الطفولة.
- اضطراب طيف التوحد.
- اضطرابات التشنج اللاإرادي.
- الوسواس القهري والاضطرابات ذات الصلة.
- الحالات العصبية والطبية الأخرى

الاضطرابات المصاحبة

- الصور النمطية هي مظهر شائع لمجموعة متنوعة من الاضطرابات العصبية الوراثية، مثل متلازمة ليش نيهان، ومتلازمة ريت، ومتلازمة X، متلازمة كورنيليا دي لانج، ومتلازمة سميث ماجينيس

اضطراب العرت Tic Disorders

معيار التشخيص

● اضطراب توريت

- وجود عرات حركية متعددة مع واحدة أو أكثر من العرات الصوتية في وقت من أوقات المرض، رغم عدم ضرورة وجودهما بصورة متزامنة.
- تتفاوت العرات في التواتر فقد تزيد أو تنقص ولكنها تستمر لفترة تزيد عن السنة.
- البداية قبل سن 18 سنة.
- لا ينجم الاضطراب عن تأثيرات فيزيولوجية مباشرة لمادة (مثل الكوكايين) أو عن حالة طبية عامة

معييار التشخيص

- عرات حركية او صوتية مستمرة (مزمناة)
- وجود عرات حركية او العرات الصوتية واحدة او متعددة لكن ليس في ان واحد في وقت من أوقات المرض،
- تتفاوت العرات في التواتر فقد تزيد أو تنقص ولكنها تستمر لفترة تزيد عن السنة.
- البداية قبل سن 18 سنة.
- لا ينجم الاضطراب عن تأثيرات فيزيولوجية مباشرة لمادة (مثل الكوكايين) أو عن حالة طبية عامة

معييار التشخيص

● عرات عابرة

- عرات حركية أو صوتية مفردة أو متعددة
- تستمر لفترة تزيد عن السنة من وقت ظهورها .
- البداية قبل سن 18 سنة.
- لا ينجم الاضطراب عن تأثيرات فيزيولوجية مباشرة لمادة (مثل الكوكايين) أو عن حالة طبية عامة
- لا يستجيب التشخيص لاضطراب توريت او عرات حركية او صوتية مستمرة (مزمنة)

التشخيص الفارقي

- . خلل الحركة الانتيابي
- الرمع العضلي. الحركة وتحدث أثناء النوم.
- الوسواس القهري والاضطرابات ذات الصلة.

الاضطرابات المصاحبة

- اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه
- الوسواس القهري والاضطرابات ذات الصلة شائعة بشكل خاص.
- الاضطرابات النفسية الأخرى، مثل الاضطرابات الاكتئابية أو ثنائية القطب أو تعاطي المخدرات.