

اضطرابات الإخراج

Elimination disorders

Enuresis

التبول

- التبول المتكرر في السرير أو الملابس، سواء كان ذلك بشكل لا إرادي أو متعمد.
- يتكرر مرتين على الأقل في أسبوع لمدة 3 أشهر متتالية على الأقل أو ضعف في المجالات الاجتماعية أو الأكاديمية (المهنية) أو غيرها من مجالات الأداء الهامة.
- العمر الزمني لا يقل عن 5 سنوات (أو ما يعادله من مستوى النمو).
- لا يُعود السلوك إلى التأثيرات الفسيولوجية لمادة ما (على سبيل المثال، مدرات البول أو الأدوية المضادة للذهان) أو حالة طبية أخرى (مثل مرض السكري أو العمود الفقري المشقوق، اضطراب النوبات).

Enuresis

التبول

- تحديد ما إذا كان:
- ليلاً فقط: مرور البول فقط أثناء النوم ليلاً.
- نهارى فقط: مرور البول أثناء ساعات الاستيقاظ.
- ليلي ونهارى: مزيج من النوعين الفرعيين أعلاه

الانتشار

- يبلغ معدل انتشار التبول 5%-10% بين الأطفال بعمر 5 سنوات، و3%-5% بين الأطفال بعمر 10 سنوات، وحوالي 1% بين الأفراد بعمر 15 سنة أو أكثر

الاضطرابات المصاحبة

- تأخر النمو، بما في ذلك الكلام واللغة والتعلم والمهارات الحركية ، التبرز، والمشي أثناء النوم، و قد يكون هناك اضطراب الرعب أثناء النوم. تعد التهابات المسالك البولية أكثر شيوعًا عند الأطفال الذين لديهم تبول، وخاصة النوع النهاري،.

التبرز

Encopresis

- المرور المتكرر للبراز إلى أماكن غير مناسبة (مثل الملابس والأرضيات)، سواء كان ذلك بشكل غير إرادي أو متعمد.
- يحدث حدث واحد على الأقل كل شهر لمدة 3 أشهر على الأقل.
- العمر الزمني لا يقل عن 4 سنوات (أو ما يعادله من مستوى النمو).
- لا يعود السلوك إلى التأثيرات الفسيولوجية لمادة ما (مثل المليينات) أو حالة طبية أخرى إلا من خلال آلية تنطوي على الإمساك.

التبرز

Encopresis

- تحديد ما إذا كان: مع الإمساك و تبول: هناك دليل على الإمساك الفحص البدني أو عن طريق التاريخ.
- بدون إمساك تبول : لا يوجد دليل على وجود إمساك من خلال الفحص البدني أو من خلال التاريخ

انتشار

- تشير التقديرات إلى أن ما يقرب من 1% من الأطفال بعمر 5 سنوات يعانون من التيرز،
- وهذا الاضطراب أكثر شيوعا في الذكور منه في الإناث.